

**Sinergija sibirskog nevena i solidola u ublažavanju  
simptoma psorijaze, atopijskog dermatitisa i ekcema**

**NOVO**

**UNAPREĐENA FORMULACIJA**

# **KARTALIN**

**herba**



- omekšava i neguje suvu i hrapavu kožu
- odstranjuje odumrle ćelije kože
- daje koži zdrav i glatak izgled
- ima efekat ljuštenja
- čuva odbrambeni mehanizam i funkcije

*ulja lavande, kamilice i eukaliptusa, salicilna kiselina, med, vitamini A i D, lizozim*

## Način primene:

Nanosi se na kožu (bez utrljavanja) 1 do 2 puta dnevno.

Urađen je veći broj kliničkih studija koje su dokazale brz efekat Kartalina sa dugim periodima remisije. Nisu primećeni slučajevi alergijskih reakcija. Profesor **Dmitruk Vadim Stepanovich** je, u okviru Sibirskog državnog medicinskog fakulteta, izveo **studiju procene kliničke efikasnosti Kartalina u lečenju psorijaze** u okviru kombinovane terapije sa EHF terapijom (tretman obolele kože elektromagnetskim milimetarskim talasima). U ispitivanje su bila uključena 153 pacijenta sa blagom i umereno teškom psorijazom, podeljeni u 3 grupe:

- **Grupa A** (30 pacijenata) - pacijenti na standardnom tretmanu (vitamini, hiposensibilizacija, detoksifikacija, smanjeno unošenje masti)
- **Grupa B** (50 pacijenata) – pacijenti na standardnom tretmanu u kombinaciji sa EHF terapijom
- **Grupa C** (73 pacijenta) – pacijenti koji su, osim standardnog tretmana i EHF terapije, koristili i Kartalin mast.

Vreme trajanja terapije – 3 nedelje.

**Procena efikasnosti** je vršena na osnovu praćenja parametra **PASI** (Psoriasis Area and Severity Index). PASI, tj. indeks raširenosti i težine kožnih promena služi za procenu raširenosti i težine psorijaze. Izračunava se na osnovu procene četiri kriterijuma: površine kože zahvaćene promenama, intenziteta eritema, infiltracije i deskvamacije. Maksimalni skor iznosi 72, što označava najtežu kliničku manifestaciju bolesti. U blaže forme psorijaze spadaju one kliničke forme bolesti kod kojih je PASI manji od 10.

### Prikaz rezultata izvedene studije

	<b>Grupa A</b>	<b>Grupa B</b>	<b>Grupa C</b>
<b>PASI</b> vrednost pre početka studije	32,6	30,43	31,1
<b>PASI</b> vrednost nakon 3 nedelje od početka studije	18,6	13,1	10,2
Procenat smanjenja (%)	42,9	56,9	<b>67,2</b>

**Zaključak:** Prema priloženoj tabeli može se uočiti da su najbolji rezultati postignuti u C grupi pacijenata, tj. najveću efikasnost imala je kombinovana terapija EHF terapije i Kartalin masti.